

1906

ÜBER
AKUTE PRIMÄR SYNOVIALE
GELENKEITERUNGEN
UND IHRE BEHANDLUNG.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

hohen medizinischen Fakultät

der

Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Giessen

vorgelegt von

WALTER BIELITZ

Oberarzt im Eisenbahn-Regt. No. III.

GIESSEN 1906

von Münchow'sche Hof- und Universitäts-Druckerei (O. Kindt).

ÜBER
AKUTE PRIMÄR SYNOVIALE
GELENKEITERUNGEN
UND IHRE BEHANDLUNG.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

hohen medizinischen Fakultät

der

Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Giessen

vorgelegt von

WALTER BIELITZ

Oberarzt im Eisenbahn-Regt. No. III.

GIESSEN 1906

von Münchow'sche Hof- und Universitäts-Druckerei (O. Kindt).

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät.
Referent: Prof. Dr. P o p p e r t.

MEINEM LIEBEN VATER

GEWIDMET.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

In den letzten Jahrzehnten ist in der Beurteilung und Behandlung von Gelenkerkrankungen durch die beispiellosen Fortschritte, die die medizinische Wissenschaft während dieser Zeit gemacht hat, ein großer Wandel eingetreten. Stand man früher mancher plötzlich und ohne äußere Veranlassung eingetretenen Gelenkeiterung wie einem Rätsel gegenüber, so können wir heute in der Regel feststellen, daß der Krankheitsprozeß durch Bakterien hervorgerufen ist, wir können sogar oft nachweisen, welcher Art diese Bakterien sind und auf welchem Wege sie das Gelenk erreicht haben. Diese Fortschritte in der Erkenntnis des Ursprungs der Gelenkentzündungen haben uns auch in der Behandlung solcher Erkrankungen gänzlich neue Bahnen gezeigt, auf denen alle modernen Chirurgen Hand in Hand gehen. Zu einem Abschluß sind freilich die ätiologischen Forschungen noch lange nicht gekommen und viele Fragen harren bis dahin noch der Lösung.

Schon darüber läßt sich streiten, was man unter einer akuten primär synovialen Gelenkeiterung zu verstehen hat. Manche Autoren, ich nenne aus der letzten Zeit A. A. Berg, halten eine idiopathische Entzündung der Synovialis für sehr selten und sind der Ansicht, daß die Gelenkerkrankung in der Regel sekundär ist und vom Knochen ausgeht oder durch die Blutbahn übermittelt wird. Meiner Ansicht nach ist diese Auffassung eine etwas zu eng begrenzte. Man wird selbstverständlich eine Entzündung, die sich vom Knochen kontinuierlich auf die Gelenkhöhle fortgesetzt hat,

niemals als eine primär synoviale bezeichnen, wohl aber verdient diesen Namen eine Gelenkeiterung dann, wenn die Synovialis den ersten Sitz der pathologischen Veränderungen bildet, gleichgültig ob die Eitererreger direkt von außen oder durch die Blutbahn ihren Weg in das Gelenk gefunden haben. Freilich wird, und damit muß man Berg Recht geben, gar oft eine Gelenkeiterung als eine primär synoviale angesehen und nachher stellt sich doch heraus, daß die Krankheit vom Knochen ausgegangen ist. Aber auch das Umgekehrte wird manchmal beobachtet werden können, wenn sich auch ein sicherer Beweis dafür nicht so leicht erbringen läßt, und in manchen Fällen wird man dauernd vor einem non liquet stehen bleiben, denn allzu gründliche Nachforschungen verbietet unter Umständen die einzuschlagende Therapie.

Diese Lücken in unserer Erkenntnis und diese ätiologischen Zweifel sind auch wohl Schuld, daß nur wenig zusammenfassende Arbeiten über das von mir gewählte Thema vorhanden sind. Erst Hartmann hat in seiner Habilitationsschrift sich ganz speziell mit den primär synovialen Gelenkeiterungen befaßt und hauptsächlich auch die in der Riedelschen Klinik übliche Behandlung genau beschrieben. Auf Hartmanns sorgfältige Arbeit, die die Anregung zu dieser Dissertation bildete, sei auch hingewiesen, um Wiederholungen von schon Gesagtem und Ausführungen von bereits zitierter Literatur zu vermeiden.

Wir beobachten primär synoviale Gelenkeiterungen häufig im Anschluß an alle möglichen Infektionskrankheiten, Typhus, Gonorrhoe, Scharlach, Dysenterie, Diphtherie, Pocken, Influenza, Erysipel etc., ja man kann sogar sagen, es gibt kaum eine Infektionskrankheit, mit der nicht schon einmal Gelenkerkrankungen in Verbindung gebracht worden wären. Es ist das Verdienst Witzels, in einer ausführlichen Monographie zum ersten Male von dem neuen, durch die Bakteriologie geschaffenen Standpunkte aus, die

Gelenkerkrankungen, soweit sie sich an solche akuten Infektionskrankheiten anschließen, besprochen zu haben. Besonders Interesse ist in letzter Zeit den durch Pneumokokken hervorgerufenen Gelenkeiterungen entgegengebracht worden; diese spielen, wie die von W. v. Brunn zusammengestellte Literatur zeigt, eine nicht geringe Rolle. Ätiologisch interessant ist auch hier, daß es durchaus nicht in allen Fällen gelingt, die Herkunft der Pneumokokken durch eine vorangegangene Lungenentzündung zu erklären. Häufig entstehen die primär synovialen Eiterungen im Anschluß an Traumen, ob sie nun das Gelenk selbst betroffen haben oder nicht, und gar manchmal bleibt die Ursache der Gelenkerkrankung gänzlich unbekannt, stets aber werden wir als die Krankheitserreger Bakterien bezeichnen müssen; für die Prognose spielen ihre Art, ihre Virulenz, ihre Vermehrung und jedenfalls auch die von ihnen abgeforderten Toxine die bedeutendste Rolle. Am häufigsten treffen wir im Gelenkeiter Streptokokken und Staphylokokken an.

Die leichteren Formen der Gelenkeiterung, bei denen eine tiefere Destruktion der Synovialis nicht eintritt, bezeichnet R. v. Volkmann als katarrhalische Gelenkeiterung. Bei ihnen steht das Exsudat im Vordergrund des Krankheitsbildes und bei frühzeitiger Entleerung des Eiters kann eine Ausheilung ohne nennenswerte Funktionsstörung erfolgen. — Im Gegensatz zu diesen Formen, bei denen eine tiefere Schädigung der Gelenkmembran nicht eintritt, gehören die Gelenkeiterungen, bei denen die pathologischen Veränderungen der Synovialis selbst in den Vordergrund treten, zu den schwersten und gefährlichsten Arthritiden. In solchen Fällen findet man im akuten Stadium die Synovialis enorm ödematös geschwollen, sie sieht dunkelblaurot aus und ist mit schmierigen fibrinösen Belägen bedeckt; die Gelenkknorpel werden meist frühzeitig zerstört. Tashiro hat einige Fälle von

Gelenkeiterungen, die durch Streptokokken verursacht waren, einer genauen pathologisch-anatomischen Untersuchung unterzogen. Die auf irgend eine Weise ins Gelenk geratenen Streptokokken fiedeln sich auf der Synovialis an und verursachen eine von dort ausgehende Entzündung; die Synovialis bedeckt sich mit Eiter, ebenso werden die Knorpelflächen mit Eiter überlagert. Geht die Krankheit nicht bald zurück, so wird auch schon der Knorpel angegriffen: er beginnt zu zerfasern und zeigt nicht mehr die normale Färbbarkeit. Der Zerfaserung folgt weiterer Zerfall, der bis zum Verlust des ganzen Knorpels gehen kann. Geht die Zerstörung weiter auf den Knochen über, so reagiert das Endost mit einer starken fibrösen Neubildung; dieses so geschaffene Bindegewebe besitzt in hohem Grade die Fähigkeit, Knochen neu zu bilden und damit erhalten wir die schweren, irreparablen Gelenkveränderungen. In einer Reihe von Fällen wird die Gelenkkapsel durchbrochen und es kommt zu periartikulären Senkungsabzessen. Als schwerste Form zeigt sich die Gelenkverjauchung, die zuweilen mit starker Gasentwicklung einhergeht.

Das klinische Bild ist charakterisiert durch die überaus große Schmerzhaftigkeit der betroffenen Gelenke, die kaum bei einer anderen Gelenkaffektion so heftig auftritt, ferner durch ödematöse Schwellung im Gebiet des Gelenks und der weiteren Umgebung, ja der ganzen Extremität. Die Haut über dem Gelenk fühlt sich heiß an, ist gerötet, bei vorgeschrittener Krankheit zeigt sich Fluktuation. Jede Bewegung wird ängstlich vermieden und das Gelenk meist leicht gebeugt gehalten und zwar so, daß die Kapsel möglichst entspannt ist. Hohes Fieber und Schüttelfröste treten auf. Naturgemäß zeigen sich diese Erscheinungen mehr oder minder schwer, vereinzelt oder gleichzeitig.

Die Behandlung dieser Gelenkeiterungen stellt an die Umsicht des Chirurgen große Anforderungen und hat sich

erst in den letzten fünfzig Jahren zu dem heutigen Standpunkt ausgebildet. In der vorantiseptischen Zeit galt die Eröffnung eines Gelenks oder der Versuch einer konservativen Behandlung eines infizierten Gelenks noch als grober Kunstfehler, man möchte sagen als ein Verbrechen gegen Gesundheit und Leben und der Chirurg war rasch mit dem Messer zur Hand, um durch eine Amputation die gefährlichen Wundverhältnisse eines eröffneten Gelenks zu umgehen. Die neue Chirurgie scheut sich nicht nur nicht, die Arthrotomie unter dem Zwange einer bestehenden Eiterung zu machen, sondern eröffnet auch Gelenke, ohne daß eine solche Indikation besteht. Die konservative Behandlungsmethode hat in der Tat die glänzendsten Resultate gezeitigt; das zeigen auch die in den letzten großen Kriegen erzielten chirurgischen Erfolge. Freilich, die überschwenglichen Hoffnungen, die man nach den in den Kliniken gemachten Erfahrungen hegte, erlitten einen empfindlichen Stoß. Man darf eben nicht vergessen, unter wie überaus ungünstigen Verhältnissen man im Kriege zeitweise arbeiten muß und wie oft die Verletzten infolge ungünstiger Verhältnisse eine geregelte Behandlung für erste entbehren müssen. Auch muß man sich hüten, etwa an der Hand der Invalidenlisten aus unseren letzten Kriegen ein Urteil zu fällen, denn aus ihnen geht nicht hervor, was die Behandlung erreicht hat, sondern sie geben nur an, ob der Verwundete nach bestimmten Gesetzesnormen Invalide geworden ist oder nicht.

Hat der moderne Chirurg auch nur einen Verdacht, daß er es nicht mehr mit einem bloßen Hydrops des Gelenks zu tun hat, so ist es seine Pflicht, das Gelenk zu eröffnen, sei es durch die Punktion oder, was in den meisten Fällen mehr angebracht ist, durch die Arthrotomie. Die breite Eröffnung des Gelenks gestattet, fibrinöse Fäden zu entfernen, die Synovialis von entzündlichen Wucherungen zu befreien und frisch gebildete Adhäsionen zu

lösen. Die sich anschließende Drainage sorgt für dauernden Abfluß des Eiters, der ja oft noch reichlich weiter gebildet wird. In vielen Fällen, bei denen man nach 14 Tagen bis 3 Wochen, wenn die Operationswunde geheilt ist, mit Massage und Mobilisation beginnen kann, hat man bei solcher Behandlung vorzügliche funktionelle Resultate zu erwarten.

Schematisieren läßt sich freilich eine Behandlung der akuten primär synovialen Eiterungen nicht; man wird stets versuchen, möglichst konservativ zu verfahren und wird in leichten Fällen von einer Punktion recht gute Erfolge haben, in schweren Krankheitsfällen wird man nicht mit einer breiten Eröffnung des Gelenks auskommen, aber manchmal doch zur Refektion, ja sogar zur Amputation schreiten müssen.

Von mehreren Garnisonlazaretten der Kgl. Preussischen Armee ist mir eine größere Anzahl von Krankengeschichten, die Gelenkeiterungen betreffen, zur Verfügung gestellt worden; es sei mir gestattet, eine kleine Auswahl derselben kurz anzuführen, um an ihrer Hand das Entstehen der Eiterung, die Entwicklung des Krankheitsbildes und die Therapie zu beleuchten. Das Material besteht durchweg aus aktiven Militärpersonen, also aus ausgesucht gefunden Leuten im Durchschnittsalter von etwa 20 Jahren; das dürfte für die Beurteilung der erzielten Resultate nicht ohne Bedeutung sein.

Die meisten der von mir angezogenen Fälle von akuten primär synovialen Gelenkeiterungen betreffen das Kniegelenk; das läßt sich ja auch bei seiner exponierten Lage und seiner gerade beim Militär wenig schonenden Inanspruchnahme leicht denken. — Ein einfacher seröser Erguß ins Kniegelenk wird meistens bei Ruhigstellung unter einem komprimierenden Prießnitzschen Verband zurückgehen. Tritt starke Schmerzhaftigkeit und Fieber auf, das auf keine andere Ursache zurückzuführen ist, so muß

man Eiter im Kniegelenk annehmen und damit ist nach dem Vorhergefügten die Behandlung gegeben. In leichten Fällen kommt man mit dem mildesten Eingriff, der Punktion, evtl. unter Einspritzung einiger ccm 5% iger Karbolsäure zum Ziel. Manchmal ist allerdings eine mehrmalige Wiederholung der Punktion notwendig, um neu angesammelte Flüssigkeitsmassen zu entfernen; aber auch diese wiederholten Eingriffe zeitigen meist ein gutes Resultat, vorausgesetzt, daß streng aseptisch vorgegangen wird.

1. Hermann H., Kanonier, aufgenommen am 19. VIII.

Anamnese: Patient leidet seit 8 Tagen ohne bestimmte Ursache an Schmerzen im linken Kniegelenk. Anfangs schenkte er der Erkrankung keine Bedeutung, machte sogar sämtlichen Dienst mit, bis der Zustand sich stetig verschlimmerte. Vor drei Monaten hat er sich einmal beim Turnen das Knie verfrungen.

Status: Das linke Kniegelenk, besonders der obere Rezeßus ist stark geschwollen. Die Patella ist abgehoben und tanzt. Das Gelenk wird gebeugt gehalten. Temperatur am Abend 38,5°.

Behandlung: Ruhigstellender Verband und Hochlagerung.

22. VIII. Punktion. Es werden 750 ccm gelben dünnflüssigen Eiters entleert. Ruhigstellender, komprimierender Verband.

25. VIII. Allmählicher Temperaturabfall und Nachlassen der Beschwerden.

1. IX. Kein Erguß mehr vorhanden. Steht ohne Beschwerden auf. Massage und Bewegungsübungen.

13. IX. Dienstfähig entlassen.

2. Friedrich Br., Musketier, aufgenommen am 16. I. 1901.

Anamnese: Vor 10 Tagen hat Patient sich auf einem Marsche infolge Stiefeldrucks und schlecht sitzenden Strumpfes die rechte Ferse durchgelaufen. Heute meldete

er sich mit Schmerzen im rechten Knie und in der Leistenbeuge krank.

Status: Dicht oberhalb der rechten Ferse findet sich eine schmutzige, vernachlässigte Wundfläche. Das rechte Kniegelenk ist geschwollen und gerötet. Der innere Gelenkknorrn ist sehr empfindlich. Nirgends Fluktuation Temperatur erhöht. Leistendrüsen angeschwollen.

24. I. Die Schwellung hat dauernd zugenommen. Die Kniescheibe ist abgehoben und tanzt. Rings um sie herum ist Fluktuation vorhanden. Durch Einschnitt unterhalb der Kniescheibe werden 350 ccm Eiter entleert. Drainage und fixierender Verband.

26. I. Die Temperatur ist auf 39° gestiegen. Die Eiterung ist sehr stark. Um daher einen besseren Abfluß zu schaffen, werden zwei Schnitte angelegt, einer oberhalb und einer nach innen von der Kniescheibe. Es entleeren sich 350 ccm schokoladenfarbiger Flüssigkeit, gemischt mit Gewebsefetzen und Eiterklümpchen. Ausspülen des Gelenks mit Salicylsäurelösung und Sublimat, sodann Einspritzen von Jodoformglycerin, Drainage, Lagerung auf Volkmannscher Schiene.

31. I. Die Temperatur ist abgefallen.

23. II. Knochenenden und Kapsel noch verdickt. Langsam fortschreitende Heilung.

20. III. Wunden verheilt. Massage und Bewegungstherapie. Andauernde Besserung der Gelenkbeweglichkeit.

10. IV. Wird ins Revier entlassen zur Fortsetzung der Übungsbewegung und um ihn langsam zum Dienst heranzuziehen.

Zweifellos ist im vorliegenden Falle die Infektion von der nicht gepflegten, eiternden Wunde aus erfolgt. Während beim ersten Falle die einmalige Punktion genügte, um eine Heilung zu erreichen, war man bei dem letzteren gezwungen, von vornherein radikaler vorzugehen. Das Fieber, die phlegmonöse Rötung und starke Schwellung

des Gelenks ließen einen Erfolg durch Punktion nicht erhoffen und lediglich Inzisionen, Gelenkauspülungen und Drainage konnten hier in Frage kommen. Diese Behandlung hat auch ein ausgezeichnetes funktionelles Resultat ergeben, ein Beweis, wie notwendig es ist, rechtzeitig dem Eiter reichlichen Abfluß zu verschaffen. Daher kommt es vor allen Dingen auf eine zweckmäßige Drainage an, die selbstverständlich am besten erreicht wird, wenn man die Inzisionen an den am tiefsten gelegenen Punkten des Gelenkes anlegt. Trotzdem kommt es bei dem komplizierten Bau des Kniegelenks doch manchmal in dessen einzelnen Abschnitten zu Retentionen, sodaß eine stets genaue Beobachtung des Fiebers und der Gelenkschwellung erforderlich ist. Man kann im allgemeinen nur dazu raten, in einigermaßen bedenklichen Fällen nicht vor großen Inzisionen zurückzufahren. Die Gefahr einer späteren Narbenkontraktur ist im Verhältnis zu den möglicherweise eintretenden Komplikationen, die sogar zur Amputation zwingen können, gering anzuschlagen und kann vor allen Dingen durch Massage und Bewegungstherapie bekämpft werden. Und darum glaube ich, daß die von Riedel, allerdings nur in ziemlich leichten Fällen angewandte Drainage durch eine Punktionswunde am besten nur in Kliniken, wo eine stete Beobachtung des Kranken und eine sofortige eingreifendere Operation möglich ist, in Anwendung zu bringen ist. Ein Drainrohr mit einem so geringen Lumen, daß es durch eine Troikartkanüle eingeführt werden kann, verstopft sich außerordentlich leicht durch Fibringerinnsel und statt der gewünschten Drainage erzielt man in solchen Fällen durch den Reiz des eingeführten Rohres eine noch stärkere Eiteransammlung als sie schon vorher bestanden hatte.

3. Christoph Sch., Musketier, aufgenommen am 1. VII. 1902.

Anamnese: Patient hat vor zwei Jahren angeblich Hirnhautentzündung durchgemacht. Eine Infektion an Gonor-

rhoe soll niemals stattgefunden haben. Vor etwa 10 Tagen traten nach dem Turnen plötzlich Schmerzen in dem rechten Kniegelenk auf.

S t a t u s: Starke Schwellung des rechten Kniegelenks, hauptsächlich im Bereiche des oberen Rezeffus. Die Haut ist hier gerötet und fühlt sich heiß an. Die Beweglichkeit des Gelenks ist vermindert.

B e h a n d l u n g: Eisumschläge, Ruhigstellung.

8. VII. In der Kniebeuge auf die Wade fortschreitend phlegmonöse Rötung und Schwellung. Temperatur abends bis 39°. Die Punktion an der Innenseite des Gelenks ergibt 150 ccm trübseröser Flüssigkeit.

9. VII. Der Erguß beginnt von neuem aufzutreten.

12. VII. Schwellung und Rötung der Wade geschwunden. Kniegelenk prall gefüllt.

14. VII. Erneute Punktion, durch die 100 ccm flockigen Eiters entleert werden (Mikroskopisch: Eiterkörperchen, Stäbchen, Kokken).

16. VII. Das Fieber besteht weiter, daher werden beiderseits der Kniefcheibe zwei 5 cm lange Schnitte geführt und dadurch 150 ccm Eiter entleert. Durchdrainieren. Antiseptischer Verband. Ruhigstellung in V o l k m a n n'scher Schiene.

24. VII. Das Fieber ist geschwunden. Weitere Behandlung mit Jodoform-Glyzerineinspritzungen.

10. IX. Wunden geschlossen. Kein Erguß mehr vorhanden

19. IX. Langsames Beginnen mit Bewegungsübungen.

27. XI. Operationswunden mit der Unterlage verwachsen. Weichteile sind etwas verdickt, Streckung vollständig, aber völliges Durchdrücken nicht möglich. Die Beugung geschieht bis etwa 90°, dabei fühlt man leises Knarren unter der Kniefcheibe. Wird als Ganzinvalide entlassen.

In der vorliegenden Krankengeschichte zeigt sich ein weniger guter Erfolg wie bei den ersterwähnten Fällen. Immerhin ist es gelungen, das Gelenk zu retten und in genügender Weise auch die Beweglichkeit zu erhalten. An eine weitere Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Gelenks ist wohl nicht mehr zu denken, da die fortgesetzte Übungstherapie während der letzten zwei Monate im Lazarett keine weitere Besserung zu erreichen vermochte. Mehrere Punktionen vermochten nicht den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen, erst durch breite Inzisionen und Drainage gelang es, den Prozeß zum Stillstand zu bringen. Die Ätiologie ist völlig unklar, aus der Krankengeschichte ist nichts darüber zu entnehmen.

Ich führe im weiteren 3 Fälle an, bei denen völlige Versteifung des Gelenks eintrat.

4. Albert R. Musketier, aufgenommen am 10. V. 1901.

Anamnese: Er wird wegen einer Zellgewebsentzündung am linken Unterarm aufgenommen, welche zwei 8 cm lange Schnitte über das linke Handgelenk und am Unterarm nötig macht. Zwei Tage darauf klagt er über heftige Schmerzen im linken Kniegelenk; die Temperatur ist auf $40,1^{\circ}$ gestiegen.

Status: Der obere Rezessus des linken Kniegelenks tritt stark hervor, letzteres ist im ganzen angeschwollen.

13. V. In ruhiger Chloroformnarkose werden zwei 8 cm lange Schnitte beiderseits der Kniekehle und ein dritter am oberen Ende des oberen Rezessus geführt. Es entleert sich grüner, dünnflüssiger Eiter wie aus den Schnittwunden am Unterarm. Drainage; Antiseptischer Verband, Ruhigstellung. Die Erscheinungen am Unterarm nehmen an Heftigkeit zu, sodaß weitere operative Eingriffe nötig werden. Es wird ein 20 cm langer Schnitt an der Außenseite des Ellenbogens bis auf den Knochen geführt. Das ganze Gewebe ist infiltriert. Am Oberarm ist ein Erysipel aufgetreten, das auf die Brust weiterwandert. Hohes Fieber.

17. V. Euphorie. Stauungspneumonie.

24. V. Die Drains am rechten Knie sind stets sehr stark mit rahmartigem Eiter angefüllt. Handbreit oberhalb der Kniescheibe an der Oberschenkelaußenseite wird durch Inzision ein abgekackter Eiterherd eröffnet. Das Periost ist hier vom noch glatten Knochen abgehoben. Drainage, antiseptischer Verband. Hohes Fieber.

24. VI. Der letzte erwähnte Schnitt wird bis zur Länge von 16 cm weitergeführt, man findet das untere Femurende vom Periost entblößt, rauh, von Eiter umspült.

2. VII. Der untere Teil des Oberschenkels und das Kniegelenk sind erheblich verdickt.

7. VII. An der Innenseite des Kniegelenks wird ein periartikulärer Abzeß eröffnet. Die Sonde dringt bis zum Schienbeinhöcker, wo eine Gegenöffnung angelegt wird.

16. VII. Temperatur normal. Allmählich verheilen die Inzisionen.

31. VIII. Das Kniegelenk ist steif, fest verwachsen. Der geringste Beugungsversuch verursacht lebhafteste Schmerzen.

27. XI. Patient wird, nachdem er sich körperlich erholt hat, mit knöchern verwachsenem Kniegelenk dienstunbrauchbar entlassen.

Hier handelt es sich um eine pyämische Gelenkeiterung. Beachtenswert ist, daß periartikuläre Abzesse auftraten, die zum Teil gewiß durch Perforation aus dem Kniegelenk entstanden waren. Während solche Abzesse meist eine Amputation indizieren, ist hier allerdings mit sehr energischem Gebrauch des Messers, das Gelenk erhalten geblieben, bei der Schwere des Gesamtkrankheitsbildes gewiß ein gewichtiger Beweis für die Richtigkeit der aufgestellten Behandlungsnormen.

Riedel hat bei den schweren Eiterungen des Kniegelenks, sich an eine typische Schnittführung gewöhnt, die den anatomischen Verhältnissen Rechnung trägt und dabei

günstige Abflußbedingungen schafft. Er führt einen Schnitt quer über die Mitte der Patella, ohne diese zu verletzen, vertieft ihn unter Durchschneidung der Ligamenta lateralia seitlich bis in das Gelenk, sodaß nur die Kniekehlenhaut frei bleibt und setzt zu beiden Seiten dieses Querschnitts zwei längsgerichtete Inzisionen, ganz entsprechend dem bei der Refektion von ihm geübten Verfahren. Man hat bei dieser Schnittführung den Vorteil, daß man keine wichtigen Sehnen und Muskeln zu verletzen braucht, man gewinnt einen verhältnismäßig günstigen Überblick über das ganze Kniegelenk und kann die Inzisionen bei einer evtl. später in Frage kommenden Refektion verwenden. Legt man Drains von diesen Schnitten aus in die Gelenkhöhle, so kann man vor allen Dingen auch den hinter den Ligamenta crucita gelegenen Gelenkabchnitt günstig drainieren und in vielen Fällen den Krankheitsprozeß aufhalten. Man erreicht mit diesem immerhin konservativen Verfahren oft noch gute Funktionsfähigkeit des Gelenks. Ich habe in dem Garnisonlazarett Gr. diese Schnittführung von einem früheren Assistenten Riedels anwenden gesehen und den guten Erfolg öfters zu beobachten Gelegenheit gehabt. Leider sind mir die betreffenden Krankengeschichten nicht zugänglich gewesen. -- Anschließend noch einige Worte über den Gebrauch der Sonde. In diesem Falle, wo bereits die schwere Infektion des Gelenks bestand, brauchte man nicht befürchten, durch eine Sondierung wesentlich zu schaden. Im Gegenteil war es geradezu geboten, sich über weiter einzuschlagende Maßregeln durch eine Sondenuntersuchung Klarheit zu verschaffen. Aber es ist durchaus zu vermeiden, sich im allgemeinen zwecks Erhärtung der Diagnose bei scheinbar nicht infizierten Gelenkwunden zu einer Sondierung verleiten zu lassen, um nicht etwa eine Infektion erst dadurch hervorzurufen. Besonders v. Bergmann hat uns hierfür durch seine von ihm im russisch-türkischen Kriege

gemachten Erfahrungen sehr eindringliche und sehr einleuchtende Lehren gegeben.

5. Gustav H., Füllier, aufgenommen am 4. III. 1898.

Anamnese: Der Vater ist an Schwindsticht gestorben. Patient selbst hat wesentliche Krankheiten nicht durchgemacht. Am gestrigen Tage veripürte er plötzlich sehr heftige Schmerzen im linken Kniegelenk und bekam Schüttelfröste.

Status: Das linke Kniegelenk ist erheblich verdickt namentlich oberhalb der Patella. Letztere tanzt. An der Innenseite des Gelenks ausgesprochene Röte und Fluktuation. Temperatur 39° .

Behandlung: Eisumföläge, Ruhigstellung.

5. III. Durch Punktion werden die 85 ccm eitrigferöfer Flüssigkeit entleert. Beweglichkeit im Gelenk völlig aufgehoben.

14. III. Erneute Punktion. Mikroskopisch finden sich Eiterzellen. Einspritzung von Jodoform-Glyzerin.

16. III. Da das Fieber nicht fällt, werden in Narkose seitlich der Kniescheibe zwei lange Schnitte angelegt, das Gelenk mit 2%iger Karbolsäurelösung ausgespült und drainiert.

15. IV. Unter weiterer Behandlung mit Jodoform-Glyzerin und Fixationsverbänden hört die eiterige Absonderung auf, die Temperatur fällt ab. Die Wunden verheilen.

10. VI. Das Kniegelenk ist ankylosisch.

30. VI. Dienstunfähig entlassen.

6. Gustav H., Musketier, aufgenommen am 20. III. 1902.

Anamnese: Patient bemerkt seit einigen Tagen heftige Schmerzen im rechten Kniegelenk, glaubt diese auf öfteres Üben des Anschlages im Knie zurückführen zu müssen.

Status: Kniegelenk im ganzen geschwollen, gerötet. Bewegung behindert, schmerzhaft. Ruhigstellung, Prießnitz'sche Umschläge.

28. III. Eine Probepunktion ergibt serösen Erguß. Behandlung dieselbe.

14. IV. Temperaturanflug. Der Oberschenkel ist stark geschwollen. 8 cm langer Einschnitt an der Innenseite oberhalb des Kniegelenks führt auf eine Eiterhöhle, die sich bis zur Femurmitte erstreckt. Drainage.

25. IV. Öfterer Verbandwechsel. Die Temperatur sinkt allmählich.

6. V. An der Außenseite des Unterschenkels dicht unterhalb des Kniegelenks wird ebenfalls ein Abzeß eröffnet. Drainage.

10. VI. Allmähliche Abflachung der Eiterhöhlen.

7. VII. Wunden geschlossen. Steht mit Krücken auf.

20. VIII. Kniegelenk steif, wenig verdickt. Muskulatur des rechten Beines schlaffer wie links.

So günstig die beiden seitlichen Schnittrichtungen, die man jetzt allgemein übt, für die Drainage erscheinen, so werden sie doch nicht immer ihren Zweck erfüllen. Aber bevor man sich entschließt, das Gelenk zu opfern, kann man noch einen Versuch mit der Durchfägung der Patella machen. Die durch H-Schnitt gebildeten Lappen werden nach oben und unten aufgeklappt und bleiben offen. König hat hierdurch gute Resultate erzielt, selbst in Fällen, wo er die schlimmste Komplikation des eiterigen Gelenks, die Senkung nach der Kniekehle und Wade schon durch lange Schnitte bekämpft und mit einer Absezung des Beines sicher gerechnet hatte.

Einen weiteren Schritt im Behandlungsgange der Gelenkeiterungen bildet die Ausführung der Resektion. Gelingt es nicht, selbst durch ausgiebigste Schnittführung und Drainage des Entzündungsprozesses Herr zu werden, so muß man sich mit dem Gedanken, die Beweglichkeit des

Gelenkes zu opfern, vertraut machen und zur Refektion schreiten. Das Gelenk ist damit freilich völlig vernichtet, aber mit einer in guter Stellung eingetretenen knöchernen Verwachsung kann man zufrieden sein. In der Tat sind die Ausichten, nach der Refektion der Eiterung Herr zu werden, recht gute, da wir durch diese Operation eben die besten Abflußbedingungen schaffen. Hatten bis dahin noch keine Durchbrüche vom Gelenk aus stattgefunden, so kann nirgends mehr eine Verhaltung des Sekrets eintreten, da nunmehr sämtliche Nischen und Taschen der Synovialis mit entfernt worden sind. Somit muß das Sekret durch die eingelegten Drains sicher abgeleitet werden. — Die beste Übersicht über das Operationsgebiet erlangt man durch die von Volkmann vorgeschriebene Art der Schnittführung, die modifiziert in einem mir zur Verfügung gestellten Falle ebenfalls zur Anwendung kam, ein Querschnitt über die Patella und zwei seitliche Längsschnitte über die hinteren Ausladungen der Femurcondylen. Ich möchte es jedoch unterlassen, auf eine Beschreibung des genannten Falles einzugehen, da es sich nach der Krankengeschichte zweifellos um Tuberkulose gehandelt hat.

In manchen Fällen, bei denen man es mit besonders virulenten Krankheitserregern zu tun hat und trotz der sorgfältigsten konservativen Behandlung ausgedehnte Eiterdurchbrüche in die Umgebung des Gelenks stattfinden, bleibt uns nichts übrig als zum Amputationsmesser zu greifen.

7. Paul N., Kanonier, aufgenommen am 26. I. 1905.

Anamnese: Patient war stets gesund, bemerkte vor 2 Tagen angeblich nach Überanstrengung beim Exerzieren Schmerzen im linken Knie.

Status: Das Kniegelenk und dessen Umgebung ist angeschwollen und sehr druckempfindlich, wird gebeugt gehalten.

28. I. Eine Probepunktion ergibt trübe, dünnflüssige, hellgrün gelbe Flüssigkeit mit zahlreichen Eiterkörperchen, ohne Eiterreger.

30. I. Durch Punktion werden 130 ccm Flüssigkeit entleert. Durchspülung mit Karbolsäurelösung. Lagerung auf Volkmann'scher Schiene.

31. I. Der Erguß hat sich sehr schnell erneuert. Die Temperatur ist auf 39° gestiegen. Beiderseits der Patella werden 7 cm lange Schnitte geführt, mit sterilem Wasser durchgespült und drainiert.

3. II. Auch der obere Rezessus wird gespalten und von sämtlichen Schnitten aus durchdrainiert. Trotzdem besteht die Eiterung heftig fort, die Temperatur hält sich zwischen 38° und 39° .

16. II. Die Schwellung ist auf die beiden oberen Unterschenkeldrittel fortgezogen und betrifft namentlich die Beugeseite. Der an der Innenseite der Patella gelegene Schnitt wird um 12 cm nach unten verlängert.

20. II. Da die Schwellung auch auf den Oberschenkel übergreift, die Temperatur auf 40° gestiegen ist, wird etwa in der Mitte des Oberschenkels die Absetzung vorgenommen.

3. III. Unge störte Wundheilung.

13. V. Wird mit brauchbarem Stumpf entlassen.

Trotzdem baldmöglichst versucht wurde, durch breite Eröffnungen dem Eiterungsprozeß Einhalt zu gebieten, fanden doch Senkungen und Durchbrüche in die Muskulatur des Ober- und Unterschenkels statt. In der Regel sucht sich der Eiter seinen Weg da, wo er den geringsten Widerstand findet; beim Kniegelenk perforiert er meistens von der Spitze des Extensorensehnenbeutels oder dem Ende des Poplitealsehnenbeutels aus in die Weichteile. Die Wadenschwellung, ein sicheres Zeichen für den Durchbruch durch den Poplitealsehnenbeutel, indizierte in diesem Falle unbedingt die Amputation. Es wurde zwar noch durch

die Verlängerung des Innenchnittes versucht, die Extremität zu erhalten, da aber bald auch der zum Oberschenkel erfolgte Durchbruch des Eiters sich durch die Schwellung deutlich anzeigte, konnte mit der hohen Amputation nicht mehr länger gewartet werden.

Hartmann erwähnt einen Fall, bei dem es gelungen ist, einen beginnenden Wadenabzeß noch durch die Refektion des Fibulaköpfchens zu koupieren. Letzteres wurde unter sorgfältiger Schonung des N. peroneus entfernt und man brauchte das Kniegelenk nur zu refezieren.

Die folgende Krankengeschichte ist völlig analog der letzten.

8. August M., Musketier, aufgenommen am 20. VI. 1904.

Anamnese: Er stammt aus gesunder Familie. Seit einigen Tagen bemerkt er ohne besondere Ursache Schmerzen im linken Kniegelenk.

Status: Kräftig gebauter Mann mit gefunden inneren Organen. Das linke Knie ist ballonartig geschwollen, gerötet, bei jeder Bewegung sehr schmerzhaft und wird gebeugt gehalten. Temperatur 40°. Patient ist etwas genommen, teilnahmslos.

In Chloroformnarkose werden beiderseits der Knie-scheibe zwei lange Schnitte geführt. Es entleert sich gelbgrüner flockiger Eiter. Einlegen starker Drains, Lagerung auf Schiene.

29. VI. Das Fieber bleibt dauernd hoch. Patient hat unter sich gelassen, hat das Aussehen eines Septischen. Puls klein, beschleunigt. Parallel den ersten, mehr auf die hintere Gelenkfläche zu, werden noch zwei lange Schnitte angelegt, wodurch eine reichliche Menge Eiter entleert wird.

10. VII. Die Eiterung besteht unverändert fort. Die Temperatur bleibt um 39°. Der ganze Unterschenkel und dicht oberhalb des Kniegelenks der Oberschenkel sind ödematös geschwollen.

18. VII. Die Schwellung nimmt weiter zu und da von einer Refektion nichts mehr zu erwarten ist, wird der Oberschenkel in der Mitte amputiert. Die abgesetzten Teile sind fulzig ödematös.

20. VII. Temperatur normal. Ugeftörter Wundverlauf.

2. IX. Mit gutem Stumpf entlassen.

In besonders schweren Fällen, bei denen neben der Gelenkeiterung noch andere Krankheiten den Körper geschädigt haben und septische Erscheinungen hinzutreten, ist es manchmal auch durch die hohe Amputation nicht möglich, den Operierten am Leben zu erhalten.

9. Emil H., Unteroffizier, aufgenommen am 22. X. 1903.

Anamnese: Der Vater starb an Rippenfellentzündung. Patient wird mit Fieber und Brustschmerzen eingeliefert.

Status: Großer, kräftiger Mann; leidet an doppelseitiger Pneumonie.

10. XI. An der Außenseite des rechten Oberschenkels wird ein hühnereigroßer Abzeß eröffnet. An der Knöchelgegend teigige Schwellung.

13. XI. Klagt über Schmerzen im rechten Bein ohne bestimmte Lokalisation.

14. XI. Das rechte Kniegelenk ist geschwollen, druckschmerzhaft und wird gebeugt gehalten.

16. XI. Die Schwellung steigert sich. Durch Punktion werden 30 ccm fadenziehender, gelber Flüssigkeit entnommen, in der sich Streptokokken, Staphylokokken und Eiterkörperchen finden. Temperatur um 39°.

19. XI. Erneute Punktion.

29. XI. Die Anschwellung des rechten Kniegelenks ist noch in mäßigem Grade vorhanden. Äußerlich keine Entzündungsercheinungen.

3. XII. Ödem des rechten Fußes.

11. XII. Die Haut des rechten Kniegelenks, das noch sehr schmerzhaft ist, zeigt sich gerötet, unterhalb der Knie Scheibe findet sich Fluktuation.

18. XII. Auf der Rückseite des rechten Oberschenkels, 15 cm oberhalb des Kniegelenks, wird eine fluktuierende Anschwellung eröffnet; aus der Wunde entleeren sich 250 ccm grünlich-gelben Eiters.

22. XII. Von der Abzefßhöhle aus gelangt die Sonde in eine zweite am inneren Oberschenkelknorren. An der rechten Hüfte dicht oberhalb des Trochanter ist eine apfelgroße, fluktuierende Geschwulst aufgetreten, aus der sich nach Inzision 150 ccm Eiter entleeren. Die Temperatur geht zur normalen herab.

29. XII. Der Kranke wird zur spezialistisch-chirurgischen Behandlung in ein anderes Garnisonlazarett verlegt.

31. XII. Nachdem Patient sich von den Anstrengungen der Überführung erholt hat, wird die Eröffnung des rechten Kniegelenks vorgenommen durch gerade von vorne nach hinten laufende Schnitte, die den seitlichen Gelenkspalt außen und innen von der Patella bis an die hintere Kapselwand eröffnen. Rechtwinklig wird auf diese eine 12 cm lange Inzision über die hinteren Ausladungen der Femurcondylen gesetzt zur ausgiebigen Drainage der hinteren Gelenktafchen. Aus dem Gelenk fließt Eiter und getrübte Synovia. Das Gelenkende des Femur ist schwer entzündet. Nach Abtragung einiger oberflächlicher Lamellen erweist sich die Spongiosa dick mit Eiter infiltriert. Eine Grenze dieser Durchsetzung ist nicht zu finden. Die Erweiterung der Wunde am Trochanter ergibt Vereiterung des dort gelegenen Schleimbeutels. Vorerst Drainage und Gipschiene vom Becken bis zu den Zehen zur Fixation des Gelenks.

4. I. Sehr reichliche Eiterung. Die zur normalen gefallene Temperatur beginnt wieder zu steigen.

12. I. Die Temperatur ist etwas gefallen. Patient ist sehr heruntergekommen und klagt beim schonendsten Anfaßen über heftige Schmerzen.

13. I. In ruhiger Morphin-Chloroformnarkose wird 15 cm unterhalb des Trochanter im Bereich des gefundenen Knochens unter Esmarch'scher Blutleere die Ablatio vorgenommen. Am abgelegten Bein zeigen die Gelenkflächen am Knie deutliche Uluren. Die Spongiosa des Oberschenkelknochens an der unteren Epiphyse ist völlig von eiterigen Herden durchsetzt, der Knochen vom Periost entblößt, sein Mark bis etwa 5 cm unterhalb der Amputationsstelle in Eiter übergegangen.

18. I. Aussehen frischer, Temperatur wenig erhöht. Reichlicher Auswurf, der eiterig-schleimig geballt ist.

23. I. Einlegen von Drains, um dem mäßig stark abgeforderten Eiter Abfluß zu schaffen. Puls noch mäßig beschleunigt. Abendtemperatur 38,5°.

12. II. Seitlich am Amputationsstumpf noch Eiterung. Drainage.

22. II. Abzeßbildung (Thrombophlebitis) am linken Unterschenkel. Spaltung.

7. III. Die Operationswunde entleert noch mäßig Eiter. Scrotum und linker Oberschenkel sehr stark ödematös. Die Temperatur hält sich unter 37,5°. Puls 120.

11. III. Im Urin Eiweiß. Ödem des linken Beines und des Amputationsstumpfes.

18. III. Die Kräfte lassen nach. Starker Auswurf. Die Operationswunde sondert noch stark ab.

22. III. In den letzten Tagen schlechtes Allgemeinbefinden. Ödem in der unteren Bauchgegend, am Stumpf, am linken Bein, am rechten Arm und im Gesicht. Auswurf blutig schleimig. Allgemeine Erschöpfung. Exitus.

Ob in diesem Falle die Gelenkerkrankung in einem ursächlichen Zusammenhange mit der vorangegangenen Pneumonie gestanden hat, läßt sich aus der Krankengeschichte nicht entnehmen, ist aber nicht unmöglich. Auch hier war man bemüht, vorerst noch den Versuch zu machen, durch breite Eröffnung des Gelenks eine übersichtliche

Drainage zu ermöglichen und die Extremität zu retten. Da sich aber bereits tiefgehende Zerstörungen im Gelenk fanden, kam nur noch die hohe Amputation in Frage. Aber auch diese brachte keine Rettung mehr, die Widerstandskraft des Körpers war gebrochen und Venenthrombosen allerorts und septische Nephritis führten zum Tode.

Fälle von akuter eiteriger Entzündung der Synovialis des Fußgelenks bin ich leider nicht in der Lage anzuführen, da es sich nach den mir in großer Anzahl zur Verfügung gestellten Krankenblättern bei den Patienten stets um Tuberkulose gehandelt hat oder doch das Vorliegen von Tuberkulose als wahrscheinlich angenommen werden mußte. Das Fußgelenk ist ja an und für sich verhältnismäßig selten akuten Entzündungen im Anschluß an Infektionskrankheiten ausgesetzt und auch die Verletzungen dieser Gegend treten an Zahl bedeutend gegenüber denen des Kniegelenks zurück. Dagegen wird wohl auch der Zufall eine Rolle dabei spielen, daß ich von so vielen Garnison-lazaretten keinen einzigen Fall von akuter primär synovialer Eiterung des Fußgelenks in Erfahrung bringen konnte. — Auch hier befließigt sich die neuere Chirurgie mehr der konservativen Methode und sucht entsprechend der Behandlung der Kniegelenkseiterungen zunächst durch Punktion zum Ziele zu kommen. Hat diese keinen Erfolg, so werden Inzisionen angelegt und zwar am besten nach der von Riedel modifizierten Schnittführung von König. Während die Königsche Methode — zwei Längsschnitte auf die vorderen Ränder beider Knöchel bis drei Finger breit unterhalb der Knöchel — hauptsächlich für tuberkulöse Gelenkerkrankungen berechnet ist und eine nur unvollständige Drainage ermöglicht, hat Riedel noch zwei weitere Schnitte, hinten bogenförmig um die Knöchel laufend angelegt, von denen aus man unter Schonung der Nerven und Gefäße nach Spaltung der Sehnencheiden hinten auf die Kapsel kommt. Der übrige Teil der Ge-

lenkkapsel wird zugänglich gemacht, indem die zwischen den beiden vorderen Schnitten gelegenen Weichteile ohne Verletzung des Periostes abgelöst werden. Durchmeißelt man nun die Knöchel, die in Verbindung mit den Rändern bleiben, in schräger Richtung, so kann man bei der nun folgenden Luxation des Gelenks das Talocruralgelenk gut übersehen und für gründliche Drainage sorgen. Hartmann erwähnt mehrere Fälle, bei denen diese Schnittführung erfolgreich zur Anwendung kam, nachdem die vorderen Schnitte allein nicht zum Ziele geführt hatten. Andererseits bespricht er noch einen Fall, bei dem von der Anlegung der vorderen Schnitte Abstand genommen wurde und die Riedelschen Inzisionen allein Erfolg brachten.

Genügen auch ausgedehnte Einschnitte nicht, um die Eiterung zum Rückgang zu bringen, nimmt der Kräftezustand infolgedessen dauernd ab, so kommt zunächst die Refektion in Frage. Das trifft sehr oft dann ein, wenn neben dem Talocruralgelenk auch noch andere Gelenke des Fußes von der Eiterung ergriffen werden. Manchmal genügt eine von den vier oben beschriebenen Schnitten aus vorgenommene Entfernung des Talus, oft wird man aber auch zu ganz eingreifenden Refektionsmethoden seine Zuflucht nehmen müssen. Führt auch diese nicht zum Ziel, so bleibt nur die Amputation übrig.

Beim Ellenbogengelenk zeigt trotz der räumlich ziemlich beschränkten Verhältnisse die Synovialis viele Nischen und Buchten, aus denen es meist nicht leicht fällt, dem Eiter Abfluß zu verschaffen. Eine Punktion hat daher kaum jemals Aussicht auf Erfolg; im Gegenteil, man wird bei den meisten Fällen von Vereiterung des Ellenbogengelenks sehr zeitig nicht nur für Inzisionen, sondern auch für geeignete Gegenöffnungen sorgen müssen.

10. Friedrich J., Sergeant, aufgenommen am 30. III. 1904.

Anamnese: Ohne nachweisbare Ursache hat Patient plötzlich Schüttelfröste und heftige Schmerzen im rechten Ellenbogengelenk bekommen.

Status: Starke Schwellung im Bereich des Gelenks, äußerste Empfindlichkeit gegen Berührung, Bewegungsbehinderung. Temperatur zwischen 38° und 39°.

Es wird ein 8 cm langer Schnitt auf der radialen Seite neben dem Olecranon geführt und als Gegenöffnung ein zweiter auf der ulnaren Seite. Im entleerten Sekret werden sowohl mikroskopisch als auch kulturell Gonokokken nachgewiesen. Drainage des Gelenks und fixierender Verband.

25. VI. Nach dreimonatiger sinngemäßer Behandlung (Massage, Bäder, Bewegungstherapie) wird Patient mit vollbeweglichem Gelenk dienstfähig entlassen.

Im vorliegenden Falle, dessen Ätiologie klargestellt ist, genügten die beiden angegebenen Schnitte. Aber nicht immer wird man dabei stehen bleiben können, denn sehr oft ist eine vollkommene Drainage gerade des vorderen Gelenkflacks erforderlich, die bei dieser Schnittführung niemals erreicht wird. Dafür käme dann nach Hartmann vorne auf der Beugeseite der nach Spaltung der Weichteile und Eröffnung der Kapsel stets vorhandene freie Raum zwischen Humerus und Radius in Frage, als einzige Stelle, an der man von vorne nach Eröffnung der Kapsel leicht ins Gelenk kommen kann.

Bei ausgedehnten Eiterungen wird man aber keine Zuflucht doch zur Refektion zu nehmen haben (Langenbeck, Es march), unbekümmert um das Allgemeinbefinden. Dabei braucht durchaus nicht eine Totalrefektion zu erfolgen, man wird sich oft mit sinngemäßen Refektionen einzelner Knochenstücke begnügen können. Riedel hat um den vorderen Gelenkflack ohne Abmeißelung von Knochenstücken drainieren zu können, vom Langenbeck'schen Refektionschnitt aus eine Durchbohrung des

Olecranon vorgenommen und durch die so geschaffenen Bohrlöcher drainiert. Bei zwei Fällen leichterer Eiterung sind hierdurch gute Resultate erzielt worden, während der Versuch einer Drainage des vorderen Gelenkfacks durch Fortmeißelung der radialen Seite des Olecranon gänzlich fehlgeschlug.

Bei schweren Fällen, namentlich wenn sich bereits Senkungsabzesse gebildet haben, bleibt nur die Totalresektion übrig, wenn nicht gar die Amputation geboten ist. Allerdings muß sehr reifliche Überlegung und Abschätzung des Für und Wider der Notwendigkeit einer Totalresektion diesen Schritt motivieren, denn abgesehen davon, daß damit eine restitutio ad integrum ein für alle mal aufgegeben ist, so ist ein gutes funktionelles Resultat nicht immer mit Sicherheit zu erwarten. Zwei wichtige Faktoren, die Energie des Arztes und der gute Wille des Patienten werden in der Nachbehandlung am meisten dazu beitragen, daß der operierte Arm wieder gut gebrauchsfähig wird.

Bei einer akuten Eiterung des Hüftgelenks kommt in der Regel nur die Resektion des Gelenkkopfes in Frage. Mit einfachen Inzisionen, die man ja bei Kindern versuchen kann, um eine erhebliche Verkürzung der Extremität zu vermeiden, kommt man sehr selten zum Ziel, da die starken Bandmassen und Muskellagen, die das Gelenk bedecken, eine wirkfame Drainage außerordentlich erschweren. Ja selbst bei der Resektion ist es meistens ratsam, den Trochanter nicht zu schonen, um dem Eiter einen völlig ungehinderten Abfluß zu verschaffen. Im übrigen können die Erfolge dieser Operation nach den heutigen Erfahrungen nicht unbefriedigend genannt werden.

Die Coxitiden mit vorwiegend flüssigem Exsudat heilen meist ohne wesentliche Funktionsstörungen. Die schweren Eiterungen dagegen führen zur Verklebung gegenüberliegender Synovialflächen, zur Kapselschrumpfung und mit- hin zur Gelenkversteifung, wenn nicht gar bei der Neigung

zu periartikulären Abzessen die Existenz des ganzen Gliedes überhaupt in Frage gestellt wird.

11. Karl K., Pionier, aufgenommen am 20. II. 1904.

Anamnese: Patient verspürt seit einigen Tagen nach Abpringen von einem hohen Gerüst auf hartem Boden Schmerzen in der linken Leistenbeuge.

Status: In der linken Leistenbeuge sowie über den Adduktoren lebhafter Druckschmerz. Bewegung im Hüftgelenk sehr schmerzhaft und aktiv sehr beschränkt. Patient liegt nach der linken Seite gedreht, der Oberschenkel ist nach außen rotiert und stark angezogen. Bei stoßweisem Druck nach der Pfanne hin äußert er lebhafte Schmerzen. Streckverband.

6. III. Die Temperatur steigt über $38,5^{\circ}$. Patient phantasiert, läßt Stuhlgang unter sich. Mittels Troikars werden dicht unterhalb des äußeren Drittels des Ligamentum Pouparti, wo eine Schwellung aufgetreten ist, 250 ccm dicken, schmutzigen Eiters entleert. Ein 10 cm langer Schnitt führt in etwa 5 cm Tiefe auf eine sich lang nach unten zum Oberschenkel erstreckende Eiterhöhle. Im Eiter wird *Staphylococcus pyogenes aureus* nachgewiesen.

16. III. Täglich Verbandswechsel. Die Stoffe sind stark durchtränkt.

23. III. Abend hohes Fieber. Über dem großen Rollhügel teigige Schwellung.

25. III. Plötzliche stoßweise Blutung aus der Operationswunde. Ein nach oben auf dem Ileopsoas hinführender Kanal wird gespalten, das Poupарт'sche Band durchschnitten. Keine Ursachen für die Blutung auffindbar. Das Bauchfell ist hinten durch Blutgerinnsel abgehoben. Nach Ausräumung derselben ist das Ende der Höhlung nicht abtastbar. Bei einer Bewegung entleert sich Eiter vom Gelenk her. Man gelangt auf die durchlöcherzte Kapsel. Kochsalzinfusion. Antiseptischer Verband,

26. III. Vom unteren Wundwinkel aus findet sich ein Eitergang unter die Adductoren. Spaltung, Verband.

3. IV. Fieber um 39°. Eiterung dauernd sehr heftig.

11. IV. Vorne und hinten vom großen Rollhügel Inzisionen mit nachfolgender Drainage.

18. IV. Nach Einwilligung in die Operation wird die Hüftgelenksrefektion beabsichtigt. Die morsche Gelenkkapsel wird stumpf abgehoben. Der vordere Teil des Kopfes, der Schenkelhals, große und kleine Rollhügel sind gesund, daher wird der Schenkelhals nicht abgenommen, nur der Kopf. Drainage, fixierender Streckverband.

9. V. Die Eiterung läßt nach, das Fieber sinkt.

13. VI. Hält sich 4 Stunden täglich im Lehnstuhl auf, geringe Bewegungen sind bereits ohne Schmerzen möglich.

7. 11. Geht mit Hilfe eines dicksohligen Stiefels nur wenig hinkend. Entlassen.

Erst die plötzliche Blutung führte hier zur Auffindung der Gelenkeiterung. Das anhaltend hohe Fieber, die vielfachen periartikulären Abzesse erheischten die Refektion des caput femoris, sollte Patient nicht an Erschöpfung zu Grunde gehen. Erst recht spät gab er seine Einwilligung zur Operation, trotzdem ist das Endresultat noch ein erfreuliches.

Hartmann erwähnt einen Fall von eitriger Hüftgelenksentzündung, bei dem man erst bei der zweiten Operation die Coxitis entdeckte. Vorher hatte man die Erkrankung als Beckenabszess angesehen, zumal das Gelenk frei beweglich und Druck nach der Pfanne absolut nicht schmerzhaft war. Die bestehende Flexion des Oberschenkels hatte man als durch einen perinephritischen oder epityphlitischen Senkungsabszess bedingt angesehen. Und ein anderer Fall, bei dem man auf Hüftgelenkseiterung fahndete, zumal nach Angaben des Patienten früher ein Knochenstück auf der sehr schmerzhaften Trochantergegend zum Vorschein gekommen war, entpuppte sich als Er-

krankung an Nierensteinen, die die Wanderung zum Oberschenkel angetreten und ein typisches Bild von Coxitis verursacht hatten.

12. Richard S., Musketier, aufgenommen am 8. XII. 1902.

Anamnese: Patient hat als Kind öfters Gelenkrheumatismus gehabt und fühlt jetzt im rechten Fuß-, linken Knie- und Hüftgelenk Schmerzen.

Status: Das linke Kniegelenk ist etwas angeschwollen, ebenso die Leistendrüsen. Sonst kein krankhafter Befund. Bettruhe und Prießnitz'sche Verbände. Mäßiges Fieber.

12. XII. Das Fieber steigt auf 39,5°. Patient deliriert zeitweise. Die Schenkelbeuge ist geschwollen. Der Oberschenkel ist abduziert und nach außen rotiert. Eine Probepunktion ergibt Eiter. (*Staphylococcus pyogenes aureus*). Abends wird die Refektion (Langenbeck'scher Schnitt) vorgenommen. Es findet sich wenig Eiter. Der obere Teil des Oberschenkelknochens mit dem Trochanter major wird entfernt. Drainage, Streckverband.

16. XII. Urinverhaltung, Patient muß katheterisiert werden. Schmerzen im rechten Handgelenk ohne nachweisbaren Befund.

19. XII. Dauernd hohes Fieber. In der Gegend des 7. Halswirbels wird ein großer flacher Abzeß eröffnet.

22. XII. Patient ist äußerst empfindlich gegen die geringste Bewegung. Die Sekretion aus der Operationswunde stinkt stark.

29. XII. Am linken Scrotum findet sich eine 1×2 cm große schwarzverfärbte Hautstelle.

31. XII. Schüttelfrost. Benommenheit.

3. I. Tod. Sektion verweigert.

Trotzdem man in diesem Falle, sobald Eiter gefunden wurde, zur sofortigen Refektion schritt, erlag der Patient der pyämischen Infektion.

Ist auch die Refektion nicht mehr im Stande, der Krankheit ein Ziel zu stecken, so bleibt als letzte Operation die Exartikulation übrig, die bei dem meist sehr geschwächten Zustand der Patienten wegen des starken Blutverlustes einen sehr schweren Eingriff bedeutet.

Wie das Hüftgelenk ist auch das Schultergelenk verdeckt gelegen unter massigen Muskeln; infolgedessen sieht man selten beträchtliche Veränderungen der äußeren Form. Diese treten erst in die Erscheinung, wenn der Humeruskopf von der Pfanne herabsinkt, einmal infolge der Muskel- und Bändererschaffung oder wenn infolge tieferer Veränderung der Gelenkteile eine pathologische Subluxation oder Luxation eintritt. Nur bei einigen Formen der Erkrankung findet sich ein stärkerer Erguß, durch den dann eine Vorwöbung im Sulcus bicipitalis oder neben dem Proc. coracoideus bedingt ist oder der von der Achselhöhle aus fühlbar ist.

Da Schleimbeutelkrankungen ähnliche Erscheinungen hervorrufen, muß man sich vor diagnostischen Irrtümern hüten. Auch die Prüfung der Funktionsstörung verlangt Aufmerksamkeit, da scheinbar reguläre Bewegungen durch Mitwirken der Scapula vorgetäuscht werden können.

Am häufigsten treten Schultergelenkseiterungen infolge von Traumen ein, offenen Schulterbrüchen oder Schußfrakturen; ferner kann auch die ganze Reihe der Infektionskrankheiten eine eitrige Omarthritis nach sich ziehen.

Die Prognose richtet sich nach der Art der Affektion, ist aber mit Berücksichtigung der späteren Funktionstüchtigkeit stets ernst. Die Behandlung folgt den bereits mehrfach erwähnten Normen. Da aber das Schultergelenk tief unter stark entwickelten Muskeln liegt, ist eine Drainage sehr schwierig.

Gelingt es bei frühzeitigem energischem Eingreifen, die Eiterung zum Stehen zu bringen, so ist es nicht aus-

geschlossen, daß man eine gute Funktion des Gelenks erhält; in der Regel aber tritt völlige Steifheit ein und dann gilt das Bestreben, eine leicht abduzierte Stellung zu erreichen. Kommt man mit einfachen Inzisionen nicht zum Ziel, so muß die Refektion gute Abflußbedingungen für den Eiter schaffen, wenn auch das Endresultat, was die Funktion des Gelenks betrifft, meist wenig erfreulich ist. Hat der Eiter sich in größerer Ausdehnung zwischen die Weichteile hindurchgearbeitet, so bleibt auch hier, als ultimum refugium nur die Vornahme der Exartikulation übrig.

Krankenblätter, an Hand derer ich die Behandlung primär synovialer Eiterung des Schultergelenkes illustrieren könnte, waren mir leider nicht zugänglich, dagegen kann ich zum Schluß über einen das Handgelenk betreffenden Fall berichten. Bei diesem Gelenk, das sich ja in Wirklichkeit aus einer ganzen Reihe von Gelenken, zusammensetzt, stehen die einzelnen Knochen, Kapseln und Bänder in so naher Beziehung zu einander, daß es kaum möglich ist, einen Überblick über den augenblicklichen Stand der Erkrankung zu gewinnen. Die Aussicht auf eine erfolgreiche Drainage ist sehr gering und meist entschließt man sich von vornherein zur Refektion, bei der man eine recht gute Gebrauchsfähigkeit erzielen kann, wenn der operative Eingriff nur so rechtzeitig geschieht, daß der Prozeß noch nicht auf die Sehnen Scheiden übergegangen ist.

13. Herrmann D. Hilfshoboist, aufgenommen am 15. X. 1902.

Anamnese: Er stammt aus gesunder Familie. Vor zwei Monaten ist er auf die linke Hand gefallen.

Status: Das ganze linke Handgelenk ist geschwollen. Zwischen Radius und Os naviculare auf dem Handrücken findet sich Fluktuation. Bewegungen erheblich beschränkt. Die vorgeschlagene Refektion verweigert Patient.

27. X. Nach Einwilligung des Kranken in die Operation wird ein 10 cm langer Längsschnitt über das Handgelenk

hinweg, etwa der Richtung des II. Metacarpus entsprechend geführt. Die Strecksehnen werden zur Seite geschoben und man findet das periarticuläre Bindegewebe speckig infiltriert. Eröffnung des Gelenks und Luxation desselben. Die Handwurzelknochen, die mit der Mittelhand durch Synostosen zusammenhängen und in der proximalen Reihe morsch und angegriffen sind, werden entfernt, Radius und Ulna bis zur Grenze gefunden Knochengewebes abgeseägt, ebenso die Epiphysen der Mittelhandknochen. Die schwammig entartete Gelenkkapsel wird gleichfalls entfernt. Tamponade mit Jodoformgaze, Verband in Supinationsstellung auf Drahtschiene.

6. XI. Verbandwechsel. Schienenverband mit Freilassung der Finger. Aktive und passive Bewegungen.

17. XI. Die Schiene bleibt fort.

29. XI. Die Wundhöhle ist fast völlig zugranuliert. Energetische Bewegungstherapie.

9. XII. Granulationsfläche überhäutet. Die Narbe beginnt fester zu werden.

30. I. Als Ganzinvalid entlassen. Beugung bis 165° , Streckung bis 180° . Bewegung in den Mittelhandfinger-gelenken kaum ausführbar. Der Daumen kann dem Zeigefinger bis zur Berührung genähert werden. An Stelle des Gelenks ist eine quer verlaufende Furche vorhanden. Pro- und Supination ist sehr erschwert.

In diesem Falle hat die Erkrankung bereits in erheblichem Maße Veränderungen an den Knochen hervorgerufen und es war die einzige Möglichkeit, durch die Resektion eine Heilung zu erzielen. Ätiologisch kommt der 2 Monate vor Aufnahme in das Lazarett eingetretene Fall auf die Hand in Betracht, wenn auch mir das Vorhandensein einer Tuberkulose nicht unwahrscheinlich ist. Aus der Krankengeschichte freilich läßt sich Sicheres nicht ableiten.

Überblicken wir noch einmal kurz das im Vorstehenden Gefagte, so geht, auch wenn wir eine Trennung der akuten

Lebenslauf.

Ich, Walter Richard Bielig, wurde geboren am 25. Oktober 1877 zu Lauenburg in Pommern, besuchte das Progymnasium dortselbst und später das Königliche Gymnasium zu Danzig, wo ich am 29. Februar 1896 das Abiturientenexamen bestand. Mein erstes Semester studierte ich in Halle, wo ich gleichzeitig meiner Dienstpflicht genügte, trat dann in die Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen in Berlin ein, auf der ich weitere neun Semester studierte. Die ärztliche Vorprüfung bestand ich am 30. Juli 1898, die Staatsprüfung am 11. Juli 1902. In meiner ersten Garnison Graudenz verblieb ich bis zum September 1904 und wurde dann nach Berlin verlegt.
